



- Primigravida, 21 anni.
- Ecografia del primo e secondo trimestre regolari. Sesso femminile.
- 28 settimane: comparsa di area cistica nel basso addome, di piccole dimensioni.
- 37 settimane: aumento di volume fino a 5 cm, lieve idronefrosi. Inviata in centro con chirurgia pediatrica per competenza.

Qual è la diagnosi?



- a) Valvole dell'uretra posteriore
- b) Idrocolpo
- c) Cisti ovarica
- d) Atresia anorettale



- Primigravida, 21 anni.
- Ecografia del primo e secondo trimestre regolari. Sesso femminile.
- 28 settimane: comparsa di area cistica nel basso addome, di piccole dimensioni.
- 37 settimane: aumento di volume fino a 5 cm, lieve idronefrosi. Inviata in centro con chirurgia pediatrica per competenza.

Qual è la diagnosi?

- a) Valvole dell'uretra posteriore
- b) Idrocolpo**
- c) Cisti ovarica
- d) Atresia anorettale



Idrocolpo/Idrometrocolpo

Segni ecografici:

- Massa cistica pelvica, mediana, retrovescicale.
- Forma allungata o "pear-shaped"
- Presenza di livello interno mobile "debris"



- Dilatazione della vagina e talvolta anche dell'utero. Relativamente rara. Usualmente sporadica.
- La causa è la presenza di una ostruzione che non permette alle secrezioni di fuoriuscire dai genitali.
- Può essere associata ad altre anomalie urogenitali come persistenza del seno urogenitale, anomalie uterine, atresia vaginale o cloaca.
- È suggerito un monitoraggio prenatale per identificare eventuale presenza di ascite, ostruzioni alle vie urinarie, poli/olgoïdramnios. Alla nascita è necessaria una attenta valutazione genitale, urinaria ed intestinale.