SIEOG

INFORMATIONS SUR L'ÉCHOGRAPHIE PRÉCOCE DU PREMIER TRIMESTRE DE LA GROSSESSE (MOINS DE 11 SEMAINES)

Qu'est-ce que l'échographie?

L'échographie est une technique qui permet de voir les organes de notre corps avec l'utilisation d'ondes sonores à haute fréquence (ultrasons, inaudibles à l'oreille humaine) qui traversent les tissus: lorsqu'elles atteignent le fœtus, elles produisent des échos qui se transforment en images sur l'échographe.

Comment puis-je passer l'examen?

L'échographie obstétricale précoce est de préférence réalisée par voie trans-vaginale, telle que l'échographie gynécologique (insertion dans le vagin d'une sonde mince avec boîtier jetable); en l'absence de pathologies spécifiques, il s'agit d'un examen indolore (parfois légèrement gênant) et exempt d'effets secondaires.

L'échographie est-elle inoffensive pour le fœtus?

L'échographie est utilisée dans la pratique obstétrique depuis plus de trente ans et aucun effet nocif sur le fœtus, même à long terme, n'a été signalé. Pour cette raison, avec les procédures adoptées aujourd'hui, l'utilisation diagnostique de l'échographie est considérée comme sans risque. Avant 10 semaines de gestation, il n'est pas recommandé d'utiliser le Doppler pour la détection de l'activité cardiaque.

Pourquoi est-il recommandé d'effectuer une échographie précoce du premier trimestre?

Les indications spécifiques sont les symptômes maternels tels que les pertes de sang vaginales et / ou les douleurs pelviennes. Cependant, l'échographie est recommandée dans toutes les grossesses, même en l'absence d'indications spécifiques, pour l'évaluation du nombre de fœtus, de leur viabilité, du site intra-utérin de l'embryon / fœtus et de la correspondance de la période gestationnelle (datation échographique de la grossesse).

La période gestationnelle quand sera-t-elle corrigée?

La période gestationnelle est corrigée par échographie sur la base de la mesure de la longueur du fœtus, entendue comme la longueur de son corps (hors jambes), c'est-à-dire la longueur cranio-caudale ou LCR, lorsqu'une dernière menstruation fiable n'est pas disponible ou lorsqu'une différence significative est constatée (> 7 jours) entre la valeur de la LCR observée et celle attendue pour la période gestationnelle en fonction de la dernière menstruation.

En plus de la date, qu'est-ce que l'échographie précoce du premier trimestre peut détecter d'autre?

Comme ci-dessus mentionné, l'échographie précoce du premier trimestre peut détecter une grossesse multiple, une fausse couche, une grossesse anormale (par exemple, une grossesse extra-utérine) ou elle peut montrer des anomalies de l'utérus et des appendices utérins. Il est rappelé que certaines conditions pathologiques, telles que la grossesse extra-utérine et les fausses couches, ne peuvent être suspectées qu'au début des périodes de gestation, et nécessitent des échographies ultérieures à court terme associées à des tests de laboratoire. En cas de grossesse multiple, il est important de définir le nombre de sacs amniotiques (amnionicité) et le nombre de placentas (chorionicité).

L'échographie précoce du premier trimestre permet-elle d'exclure tous les problèmes de grossesse?

L'échographie obstétricale précoce ne peut pas exclure d'autres problèmes de grossesse au-delà de ce qui est spécifié. Il convient de noter que le diagnostic de toute pathologie de la grossesse du premier trimestre n'est pas toujours effectué lors du premier examen échographique et que certains de ces diagnostics ne sont pas toujours réalisables avec un haut degré de fiabilité (par exemple, grossesse extra-utérine).

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ À L'ÉCHOGRAPHIE PRÉCOCE DU PREMIER TRIMESTRE

Je Soussignée _____ ***déclare :***

1. D'avoir été informée en détail de l'échographie précoce du premier trimestre et d'avoir compris le contenu de l'information.
2. D'avoir eu l'occasion de poser des questions au Médecin et d'avoir obtenu des réponses satisfaisantes.
3. D'être consciente du fait que cette évaluation est recommandée mais pas obligatoire, et de vouloir l'effectuer, en sachant que l'échographie précoce du premier trimestre peut révéler des images pathologiques, et nécessiter d'informations diagnostiques supplémentaires.

DATE ***SIGNATURE DU PATIENT***